

УТВЕРЖДЕНА  
приказом председателя  
Комитета фармации  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан  
от «\_29\_»\_\_11\_\_2017 года  
№ N012137

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства  
Анти-Бит**

**Торговое название**

Анти-Бит

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Лечебный шампунь

**Состав**

100 мл препарата содержат

*активное вещество* - сумитрин 408.00 мг;

*вспомогательные вещества*: натрия лаурил эфир сульфат, кокосового масла диэтанола амид, кислота сорбиновая, полиол эфир жирной кислоты, вода очищенная.

**Описание**

Прозрачная жидкость светло-желтого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для уничтожения эктопаразитов (включая чесоточного клеща).

Фенотрин.

Код АТХ P03AC03

**Фармакологические свойства**

**Фармакокинетика**

Незначительные количества сумитрина всасываются кожей.

**Фармакодинамика**

Шампунь Анти-Бит является препаратом, используемым для лечения и профилактики педикулеза волосистой части головы и лобковой зоны. Его действующее вещество сумитрин представляет собой одно из синтетических производных пиретринов, получаемое из экстрактов цветков пиретрума. Вещество оказывает педикулоцидное и овоцидное

действие на вшей волосистой части головы и лобковых вшей (*Pediculus humanis var. capitis*, *Pediculus pubis*) и их гнид.

### **Показания к применению**

Лечение и профилактика педикулеза волосистой части головы и лобковой области.

### **Способ применения и дозы**

Намочить волосы и нанести достаточное количество шампуня Анти-Бит в корни волос и втирать массажными движениями.

В лечебных целях шампунь рекомендуется использовать 2 раза с промежутком в 24 часа.

1-ый день:

- Намочить волосы, нанести достаточное количество шампуня Анти-Бит по всей поверхности головы, хорошо вспенить и смыть.
- Нанести второй раз и с целью улучшения воздействия препарата подождать 5 минут. Затем тщательно промыть водой. Для устранения мертвых вшей и гнид необходимо тщательно расчесать волосы мелкой расческой, входящей в комплект шампуня.

2-ой день:

- Повторить процесс, указанный для первого дня лечения.

Данный процесс лечения должен быть достаточным для устранения вшей и гнид. Для уверенности в уничтожении всех вредителей необходимо проводить лечение 1 или 2 раза в неделю.

Лечение педикулеза лобковой области аналогично лечению педикулеза волосистой части головы. Необходимо следить за тем, чтобы лекарственное средство было распределено по всей волосистой части лобковой области, внутренней стороне бедер и области вокруг ануса.

#### *Почечная и печеночная недостаточность*

Особых предписаний по применению для пациентов с почечной и печеночной недостаточностью нет.

#### *Применение у детей*

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 2-х лет.

Для детей старше 2-х лет доза не изменяется.

#### *Применение у пожилых пациентов*

Доза не изменяется.

### **Побочные действия**

У пациентов, использующих шампунь Анти-Бит, в очень редких случаях может возникать зуд, ожог, отек или эритема. Однако, данные симптомы обычно возникают в связи с заражением педикулезом, нежели в связи с использованием лекарственного средства.

В связи с тем, что через кожу всасывается незначительное количество шампуня Анти-Бит, он не оказывает системного влияния на организм.

## **Противопоказания**

- лицам с известной гиперчувствительностью к одному из компонентов препарата или к экстрактам пиретрума
- без рекомендации врача детям в возрасте до 2-х лет

## **Лекарственные взаимодействия**

Известных взаимодействий с другими лекарственными средствами нет.

## **Особые указания**

Наночить волосы и нанести достаточное количество шампуня Анти-Бит в корни волос и втирать массажными движениями.

При возникновении гиперчувствительности во время использования препарата лечение следует прекратить.

При использовании шампуня Анти-Бит следует избегать попадания его в глаза и рот. В случае попадания шампуня в глаза или рот их необходимо тщательно промыть водой. При случайном глотании препарата необходимо срочно обратиться к врачу.

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 2-х лет.

Следует воздерживаться от длительного использования препарата.

В случае заражения в таких общественных местах, как детские сады, детские дошкольные учреждения, школы, рекомендуется применение препарата один раз в неделю в качестве профилактики во время существования риска заражения. При массовом применении следует использовать перчатки, если обработка шампунем осуществляется одним и тем же лицом.

Во время использования шампуня одежда, постельное белье и полотенца должны промываться, ковры и предметы домашнего обихода должны тщательно вычищаться.

При возникновении заражения в семье, рекомендуется, чтобы все члены семьи прошли лечение препаратом для профилактики.

Применение продукта может воздействовать на завитые, слегка окрашенные, окрашенные и обесцвеченные волосы.

Анти-бит шампунь содержит 0.153 г сорбиновой кислоты в 1 дозе, что может вызвать локальные кожные реакции (такие как кожный дерматит).

### *Беременность и лактация*

Достаточного количества данных об использовании препарата у беременных женщин и кормящих матерей нет. Лечение при беременности и в период грудного вскармливания должно назначаться только при обоснованной необходимости.

*Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Данных о каких-либо воздействиях препарата на способность к вождению и использованию машин нет.

## **Передозировка**

Случаев проглатывания шампуня Анти-Бит не зарегистрировано. При случайном проглатывании необходимо сразу выполнить промывание желудка и следить за дыханием. В случае проглатывания большого количества, необходимо принять пралидоксим вместе с атропином.

#### **Форма выпуска и упаковка**

По 150 мл препарата разливают во флаконы из полиэтилена высокой плотности, закупоренные полиэтиленовой пробкой и закрываемые закручивающейся крышкой из белой пластмассы.

На флакон наклеивают этикетку из бумаги этикеточной.

Флакон вместе с расческой и с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную пачку.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25°C, в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте!

#### **Срок хранения**

3 года

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

#### **Владелец регистрационного удостоверения**

Санофи Саглык Урюнлери Санаи ве Тиджарет А.О.

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti., Büyükdere Cad. No:193 Levent, İstanbul, Turkey

#### **Производитель**

Зентива Саглык Урюнлери Санаи ве Тиджарет А.О.

(Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.)

*Адрес местонахождения:* Кючуккарыштыран 39780 Люлебургаз  
Кырыкларели, Турция

(39780 Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, Turkey)

*Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)*

ТОО «Санофи-авентис Казахстан»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Фурманова 187Б

телефон: +7(727) 244-50-96

факс: +7 (727) 258-25-96

e-mail: [quality.info@sanofi.com](mailto:quality.info@sanofi.com)

***Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства***

ТОО «Санофи-авентис Казахстан»

Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Фурманова 187 Б

телефон: +7(727) 244-50-96

факс: +7 (727) 258-25-96

e-mail: [Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com](mailto:Kazakhstan.Pharmacovigilance@sanofi.com)